Un altro modo di guardare il cielo:
Astronomia con fotoni e raggi cosmici carichi con esperimenti a
terra e nello spazio

Aldo Morselli

INFN e Università di Roma Tor Vergata

Cosa Riceviamo dal Cielo

- Radiazione Elettromagnetica
- Raggi Cosmici
- Neutrini
- Particelle Esotiche ?
- Onde Gravitazionali

Apri la tua mano...

**Nel tempo impiegato
a leggere questa frase
circa 20 particelle
(per lo più "muoni")
la avranno attraversata!**

i "muoni" vengono create dai
"Raggi Cosmici", particelle di vario tipo
che dallo spazio esterno entrano nella
nostra atmosfera ed interagiscono con
l'atmosfera stessa

1912: Scoperta dei 'Raggi Cosmici'

- Victor Hess volò su pallone ad un'altitudine di 5000 metri
- Misurò le radiazioni con un elettroscopio...
- ... e trovò che questa aumentava con l'ascesa del pallone

• **Ciò fu una grande sorpresa perché si pensava che questa radiazione fosse generata da materiale radiattivo nella crosta terrestre**

- 1926 Millikan introdusse il nome di 'cosmic rays' (raggi cosmici)

l'elettroscopio

Il Primo rivelatore utilizzato per mettere in evidenza l'esistenza dei raggi cosmici , è stato l'elettroscopio usato da **Victor Hess**:

Hess notò che, a differenza di quanto atteso, le foglioline d'oro del suo strumento si riavvicinavano molto più rapidamente quando era ad una grande quota rispetto a quanto succedeva quando era a Terra

- la scarica dell'elettroscopio indica che il gas interno all'ampolla è ionizzato
- la ionizzazione è provocata da particelle cariche che attraversano l'ampolla
- se il livello di ionizzazione cresce con la quota, i raggi cosmici (che non si chiamavano ancora così) devono necessariamente venire da sopra l'atmosfera.

Hess bei Ballonlandung (1912).

Fig. 2. Victor Hess (in the middle) and his crew in the balloon gondola after the landing in Pieskow.

Raggi Cosmici

- Particelle cariche : protoni, antiprotoni, elettroni, positroni, nuclei , antinuclei (?), Altro (?)
- Risentono dei campi elettrici e magnetici
- Portano da distanze differenti un campione di materiale galattico ed extragalattico ed accelerato ad energie molto elevate.

C.R.: come vengono studiati e cosa ci dicono?

Anni 1930-1950:

Strumenti: camere a nebbia, emulsioni, contatori Geiger, etc.

I raggi cosmici permettono di scoprire l'antimateria (positroni), i muoni, i pioni, le particelle "strane"...

Attualmente: principalmente sonde per lo studio dell'astrofisica

Cosa sappiamo oggi dei Raggi Cosmici ??

- ~ 1000 particelle/(s·m²)
- nuclei ionizzati: 90% protoni, 9% particelle α , nuclei più pesanti
- quale è l'origine dei raggi cosmici ?
 - nel sistema solare ? una piccola quantità associata a fenomeni violenti nel Sole e caratterizzata da grande variabilità temporale
 - nella galassia: la maggior parte. Si nota anche una anticorrelazione con intense attività solari
 - extragalattica: la parte più energetica dello spettro

Cosa altro sappiamo oggi dei Raggi Cosmici

Distribuzione in energia dei R. C.

- Rivelate particelle elementari, protoni, con energia maggiore di 10^{21} eV (come quella di una palla da tennis lanciata in prima battuta da un campione di tennis ~150km/h)

- Molte domande senza risposta:

- Da dove vengono ? Dalla nostra Galassia ?
- Quale meccanismo è capace di accelerarle ?
- ...

Per rivelare i raggi cosmici di energia così elevata è necessario un rivelatore di grandi superficie: più di 1 km²

Onde Radio, raggi di sole, fotoni Gamma

Lo spettro elettromagnetico

Le 2 relazioni fondamentali:

$$E = h \nu$$

E = energia

ν = frequenza

$$c = \lambda \nu$$

c = velocità della luce

λ = lunghezza d'onda

Una utile unità di misura: elettronvolt (eV)

- L'energia delle particelle si misura in eV
 - Energia acquisita da un elettrone muovendosi in una differenza di potenziale di 1 Volt

- La luce visibile ha un energia di 1,6 / 3,4 eV
- 1 MeV (1.602×10^{-13} J): 2 volte l'energia a riposo dell'elettrone
- 200 MeV: Energia media della fissione di un nucleo di U-235
- 125.1 ± 0.2 GeV: La massa del bosone di Higgs
- 1 TeV: Mille miliardi di eV, l'energia cinetica di una zanzara in volo

Nota: KeV = 10^3 eV MeV = 10^6 eV GeV = 10^9 eV TeV = 10^{12} eV

Radiazione elettromagnetica

Spettro di luce visibile all'occhio umano

ma esistono i raggi gamma ?

e come vengono prodotti ?

Chi emette raggi gamma?

Blazar (*blazing quasi-stellar object*)

O Nuclei Galattici Attivi (AGN)

Gamma Ray Burst (GRB)

Pulsar

Resti di supernova

Esplosione di supernova

Esplosione di SuperNova

Una SuperNova indica la fine esplosiva della vita di una stella massiva (>10 masse solari); nella nostra galassia circa una SN ogni 50 anni

Particelle (protoni e nuclei fabbricati durante la vita della stella) vengono espulsi e poi accelerati nell'”onda d'urto” che si forma

NEBULOSA DEL GRANCHIO

Astronomi cinesi ne registrarono l'esplosione nel 1054.

Mentre i fotoni prodotti vanno dritti ed in circa 5000-50000 anni escono dalla galassia, le particelle cariche espulse rimangono intrappolate dai campi magnetici anche per 10 milioni di anni

Questo meccanismo puo' spiegare gran parte dello spettro di energia dei raggi cosmici (fino a circa 10^{16} eV)

La CRAB Pulsar

Blazar

un buco nero rotante in un disco di accrescimento

Blazar

Modelli per l'emissione di alta energia da buchi neri al centro di galassie attive

Lampi di raggi Gamma

Fisica delle particelle => Astrofisica delle particelle

acceleratori terrestri

acceleratori cosmici

Diameter of collider

Energy of accelerated particles

La teoria del **big bang** descrive l'evoluzione dell'Universo da uno stato caldo e denso (10^{50} volte la densità attuale), **13,7 miliardi di anni fa**, ai giorni nostri.

La rivelazione di una **radiazione elettromagnetica** - relitto del big bang - ne dà un'importante conferma sperimentale.

Ma il **95 %** della massa dell'universo resta di natura sconosciuta. Si tratta di una misteriosa **materia ed energia oscura**.

L'esistenza della materia oscura è dedotta da misure della velocità di rotazione delle galassie. Tali misure portano a ipotizzare la presenza di un alone sferico di materia invisibile (non luminosa) nel quale sarebbe immersa ogni galassia.

La materia predominante nell'Universo e' la stessa materia di cui siamo fatti noi ?

La Galassia

terra

Di cosa è fatto l'Universo?

Ora sappiamo che esiste della materia oscura, necessaria per spiegare la dinamica delle stelle nelle Galassie e delle galassie negli ammassi di Galassie.

Questa materia oscura non è composta della stessa materia di cui siamo fatti noi, ma non sappiamo ancora cos'è

- Le stelle periferiche delle galassie ruotano più velocemente della velocità di fuga e l'unica spiegazione è che ci sia più materia di quella che vediamo nella galassia. Questa è un'evidenza indiretta della presenza di materia oscura.

Evidenza di Materia Oscura nelle Galassie

M33 rotation curve

Le osservazioni evidenziano la presenza di un alone di materia oscura (“dark halo”). La materia oscura contenuta nell’alone contribuisce a determinare la “forza centripeta” e costituisce un “legame gravitazionale” che permette alle stelle della galassia, anche le più lontane, di conservare una velocità di rotazione di circa 250 km/s

Evidenza di Materia Oscura nelle Galassie

Dalle leggi fondamentali della meccanica sappiamo che una stella di massa m in rotazione in una Galassia deve soddisfare la relazione

$$F = ma = m \frac{v^2}{R} = m \frac{G \cdot M(R)}{R^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \cdot M(R)}{R}}$$

acc. centripeta acc. gravitazionale

Si misurano le velocità orbitali delle stelle in galassie a spirale (Via Lattea, M31) e si confrontano le misure con l'andamento "Kepleriano" della velocità in funzione dal centro della Galassia in questione.

$z=11.9$

800 x 600 physical kpc

Diemand, Kuhlen, Madau 2006

Simulazione in funzione del tempo

Distribuzione della materia oscura secondo le simulazioni

Inventario della materia nell' Universo

Allora, cos'è la materia oscura?

Solo il 15% della materia dell'Universo è composta della stessa materia di cui siamo fatti noi . Una nuova rivoluzione Copernicana !

ma come si fa a scoprire di cosa è fatta la materia oscura ?

Dai quark al Cosmo

L' Universo

Teorie della grande unificazione

viale
dell'Astronomia

via
della Fisica

Supersimmetria

Particella $\longleftrightarrow$ Partner
supersimmetrico

è possibile che la materia oscura sia formata dalla particella supersimmetrica più leggera, unico rimasta dopo il Big bang

E' anche possibile che il nostro universo a quattro dimensioni (spazio-tempo) non sia che la parte visibile di un mondo costituito in realtà da dimensioni supplementari.

Se la teoria della supersimmetria fosse vera, la particella supesimmetrica più leggera potrebbe essere la principale componente della materia oscura.

Un modo per scoprirlo è quello di osservare il cielo nei raggi gamma per vedere se ci sono annichilazioni di particelle supersimmetriche che, secondo la legge $E=mc^2$, darebbero raggi gamma, antiprotoni e positroni

Neutralino WIMPs

Assumiamo che χ sia presente nella galassia

- χ è l'antiparticella di se stessa e può annichilare producendo raggi gamma, antiprotoni e positroni
- L' antimateria non è prodotta in grandi quantità nei processi standard (produzione secondaria attraverso $p + p \rightarrow \text{anti } p + X$)
- Quindi qualsiasi contributo extra da sorgenti esotiche è interessante
- per esempio: $\chi \chi \rightarrow \text{anti } p + X$
- prodotti (per esempio) $\chi \chi \rightarrow q / g / \text{gauge boson} / \text{Higgs boson}$
e decadimenti successivi adronizzazione

MASS Matter Antimatter Space Spectrometer

5 September 1989

il Calorimetro di MASS89

il Calorimetro di MASS89

da Las Cruces a Prince Albert

il laboratorio era un hangar !!

pausa di relax (in attesa del vento favorevole)

il giorno del lancio

MASS 89 :il recupero

MASS 89

MASS 89

PAMELA

Payload for **A**ntimatter
Matter **E**xploration and
Light Nuclei **A**strophysics

In orbita dal Giugno 2006, a
bordo del satellite DK1
lanciato da un razzo Soyuz
dalla base di lancio di
Bajkonour

Pamela

Rapporto Antiprotoni/protoni

2009: rapporto positroni / (elettroni+positroni)

Il volo di CAPRICE 94

il calorimetro silicio-tungsteno di CAPRICE

48 cm

48 cm

Rivelare i raggi gamma

La produzione di coppia elettrone - positrone avviene attraverso la trasformazione dell'energia elettromagnetica associata al fotone (il raggio gamma) quando interagisce con il campo elettromagnetico del nucleo pesante (tungsteno, piombo). Questo è possibile grazie a:

- l'equivalenza energia-massa $E=mc^2$
- il meccanismo quantistico di interazione tra il fotone e il campo elettromagnetico

Trasparenza dell'atmosfera

Onde Radio, raggi di sole, fotoni Gamma Come si rivelano?

GILDA

La tecnologia di AGILE

Anticoincidenza

SuperAGILE

Tracciatore
al Silicio

Mini-Calorimetro

AGILE : Istituti e Industrie coinvolte

INAF

**AGILE Satellite
(IABG, Munich
June 16, 2006)**

AGILE in Sriharikota, April 10, 2007

PSLV-C8 launch, 23 Apr. 2007

AGILE

23 April 2007

Happy 12th Birthday Agile !!

Il Telescopio di raggi Gamma FERMI

Fermi : una collaborazione internazionale

American Institutions

SU-HEPL Stanford University, Hanson Experimental Physics Laboratory ,
 SU-SLAC Stanford Linear Accelerator Center, Particle Astrophysics group
 GSFC-NASA-LHEA Goddard Space Flight Center, Laboratory for High Energy Astrophysics
 NRL - U. S. Naval Research Laboratory, E. O. Hulburt Center for Space Research, X-ray and gamma-ray branches
 UCSC- SCIPP University of California at Santa Cruz, Santa Cruz Institute of Particle Physics
 SSU- California State University at Sonoma, Department of Physics & Astronomy , WUSTL-Washington University, St. Louis
 UW- University of Washington , TAMUK- Texas A&M University-Kingsville, Ohio State University

Italian Institutions

INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare and Univ. of Bari, Padova, Perugia, Pisa, Roma Tor Vergata,
 Trieste, Udine
 ASI - Italian Space Agency
 IASF- Milano, Roma

Japanese Institutions

University of Tokyo
 ICRR - Institute for Cosmic-Ray Research
 ISAS- Institute for Space and Astronautical Science
 Hiroshima University

French Institutions

CEA/DAPNIA Commissariat à l'Energie Atomique, Département d'Astrophysique, de physique des Particules,
 de physique Nucléaire et de l'Instrumentation Associée, CEA, Saclay
 IN2P3 Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, IN2P3
 IN2P3/LPNHE-X Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Energies de l'École Polytechnique
 IN2P3/PCC Laboratoire de Physique Corpusculaire et Cosmologie, Collège de France
 IN2P3/CENBG Centre d'études nucléaires de Bordeaux Gradignan
 IN2P3/LPTA Laboratoire de Physique Theorique et Astroparticules, Montpellier

Swedish Institutions

KTH Royal Institute of Technology
 Stockholms Universitet

Collaboration members:	~390
Members:	121
Affiliated Scientists	~96
Postdocs:	68
Graduate Students	105

Il Satellite Fermi

- Fermi Gamma-Ray Space Telescope è una missione spaziale internazionale per lo studio della radiazione gamma di origine astrofisica
- Il satellite è composto da 2 strumenti:
 - Il Gamma-Ray Burst Monitor (GBM)
 - Effettua misure di GRB e eventi transienti ad energie tra 8 keV e 40 MeV
 - Il Large Area Telescope (LAT)
 - Effettua misure di raggi gamma ad energie tra 20 MeV e oltre 300 GeV

Fermi Gamma-ray Space Telescope

DoE – NASA – international partnership

GLAST renamed *Fermi* by NASA on August 26, 2008

<http://fermi.gsfc.nasa.gov/>

“ Enrico Fermi (1901-1954) was an Italian physicist who immigrated to the United States. He was the first to suggest a viable way to produce high-energy particles in cosmic sources. Since gamma-rays are produced by interactions of such energetic particles, his work is the foundation for many of the studies being done with the **Fermi Gamma-ray Space Telescope**, formerly GLAST.

Il Telescopio di raggi gamma Fermi

Large Area
Telescope

Gamma ray
Burst
Monitor

Assemblaggio presso la G&A ad Oricola

Tray Test at INFN Roma 2

Navigation and zoom controls including directional arrows, a 'CENTER' button, and a zoom level indicator set to 0.25%.

Toolbars for alignment and zooming, featuring 'BKR' labels, red arrows, and zoom settings for 2x, 10x, 20x, and 50x.

Align Chuck
The Alignment process takes two points along a street on a wafer. The chuck will move automatically to either side of the wafer as determined by the distances from center.
 Automatically turn on chuck vacuum
Buttons: OK, Begin, Cancel

Control panel with buttons and input fields:
in
R: 45
ZM
Bad strips: 1
on
act
9207.500000

Hansol

Windows taskbar showing open applications: **VideoTracer I...**, **LabVIEW**, **Main_Measure**, **AC_acq_fast...**, and **Navigator for...**. The system clock shows 11:25.

Tray Test at INFN Roma 2

INFN Roma
Tor Vergata

Test dei piani di silicio presso l' INFN di Roma Tor Vergata

Integrazione finale di GLAST a SLAC (Università di Stanford)

20/10/05

I numeri del tracciatore del telescopio spaziale di raggi gamma Fermi

**11.500 rivelatori
~ 1M canali di
elettronica**

**83 m² superficie di
Silicio**

**> 240K functional test
recorded in DB
~ 30M di test sulle**

Fermi prima dell'installazione

Fermi, Modello di carta

<http://people.roma2.infn.it/~aldo/GLASTpaperModel.pdf>

**Fermi
all'interno del Delta 2**

11 June 2008

11 June 2008

11 June 2008

11 June 2008

11 June 2008

11 June 2008

Fermi in orbita

GLAST Latitude = S 23 28 20.36 Longitude = W 09 05 30.98 Altitude = 555.92 km

- Per rintracciare il satellite: <http://observatory.tamu.edu:8080/Trakker>
- Per vedere il satellite sopra la città :
http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/glast_online.html

Daily Gamma-ray Sky

08-AUG-2008

Primo Catalogo delle sorgenti viste dal telescopio Fermi (11 mesi, 1451 sorgenti)

http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/1yr_catalog/

arXiv:1002.2280

Primo Catalogo delle sorgenti viste dal telescopio Fermi (11 mesi, 1451 sorgenti)

○ AGN	□ SNR
× AGN-Blazar	○ PWN
□ AGN-Non Blazar	× PSR
○ No Association	⊗ PSR w/PWN
□ Possible Association with SNR and PWN	◇ Globular Cluster
○ Possible confusion with Galactic diffuse emission	× HXB or MQO
□ Starburst Galaxy	
— Galaxy	

Il cielo nell'ottico

da confrontare con il precedente esperimento EGRET (298 sorgenti)

Quarto Catalogo delle sorgenti viste dal telescopio Fermi

5098 sorgenti
coordinate galattiche

□ No association	■ Possible association with SNR or PWN	× AGN
★ Pulsar	△ Globular cluster	★ Starburst Galaxy
■ Binary	+ Galaxy	◇ PWN
★ Star-forming region	□ Unclassified source	★ Nova

M.Ackermann et al. [Fermi Coll.] 4FGL: Fermi-LAT Fourth Source arXiv:1902.10045

Science 325 (5942), 840-844
Science 325 (5942), 848-852

Il cielo pulsante nei raggi gamma

- New pulsars discovered in a blind search
- Millisecond radio pulsars
- Young radio pulsars
- Pulsars seen by Compton Observatory EGRET instrument

Pulsazioni a 1/10 della frequenza reale

Happy 11th Birthday Fermi !!

11 June 2008

Pisa 15 March 2018

GW170817

Fermi

Reported 16 seconds
after detection

LIGO-Virgo

Reported 27 minutes after detection

INTEGRAL

Reported 66 minutes
after detection

Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger ApJL 848 L12 2017 [arXiv:1710.05833] 3656 authors !

GBM e Onde Gravitazionali: 17 08 2017

17 agosto 2017: coalescenza fra due Stelle di neutroni

Diverse particelle, diversi orizzonti ...

- p e γ assorbiti o deviati dalla materia e dalla radiazione interstellare
- i neutrini (ν):
 - essendo privi di carica non sono deflessi dai campi magnetici
 - interagiscono debolmente quindi possono attraversare grandi distanze permettendo di osservare l'Universo lontano

Astronomia multimessaggero: neutrini

- I buchi neri delle galassie attive sono le sorgenti dei neutrini e quindi dei raggi cosmici di altissima energia (UHECR) ?
- Il caso di EHE 170922 (TXS 0506 +056)

Fermi-LAT and MAGIC observations of IceCube-170922A's location.

Science 361, eaat1378 (2018) 12 July

Tornando alla materia oscura

Distribuzione della materia oscura secondo le simulazioni

con il telescopio Fermi si spera di rivelare i gamma provenienti dall'annichilazione di materia oscura nelle sotto-strutture

.. ma anche in molti altri segnali

Satelliti:

basso fondo ma
statistica bassa

Galactic center:

statistica buona ma fondo
elevato

Alone della Via Lattea:

buona statistica ma
fondo elevato

+ Spettro
di elettroni
e

Anisotropie

Extra-galattico:

buona statistica ma
fondo elevato a causa
di sorgenti astrofisiche
e del fondo galattico
diffuso

Linee spettrali:

nessuna incertezza
astrofisica ma
statistica bassa

cluster di galassie:

basso fondo ma
statistica bassa

Spettro Energetico dei fotoni dal centro galattico

(regione di $7^\circ \times 7^\circ$ centrata nel Centro Galattico,
11 mesi di dati, $E > 400 \text{ MeV}$)

Residui dei fotoni dal centro galattico (dati - modello)

regione di $7^\circ \times 7^\circ$ centrata nel Centro Galattico, 11 mesi di dati, $E > 400 \text{ MeV}$)

- Incertezza sistematica $\sim 10\%$ at 100 MeV e 20% at 10 GeV

potrebbe essere un segnale dalla
materia oscura ?

forse.

bisognerà escludere tutte le altre
ipotesi,
rendere più precisi i modelli,
c'e' ancora molto lavoro da fare
ma e' un bel lavoro!

E a energia piu' alta?

**COSA SUCCEDA QUANDO UN FOTONE
O UNA PARTICELLA DI ALTA ENERGIA
COLPISCONO L'ATMOSFERA?**

Intensità dell'immagine

↳ *energia*

orientamento

↳ *direzione*

Forma dell'immagine

↳ *tipo di particella*

Time = 11.0 nanoseconds

γ Imaging Air Cherenkov Technique

Shower
5 km

Cherenkov radiation

~10 km

1.4°

140 m

L'UNIONE FA LA FORZA

INCROCIANDO LE
INFORMAZIONI
PRODOTTE DA
DIVERSI TELESCOPI
SI OTTENGONO
RISULTATI MIGLIORI

Simulation:

Superimposed images from
8 cameras

Una schiera di telescopi Cherenkov **COME ?**

- γ di bassa energia sono tanti ma producono segnale debole
- γ di alta energia sono pochi ma producono segnale forte

→ ci vogliono telescopi molto grandi

sono pochi ma producono segnale forte

→ specchi piccoli sparsi

Pochi telescopi grandi per le basse energie su grande area

~km² schiera di telescopi medi

7 km² schiera di piccoli telescopi

4 LSTs

~70 SSTs

~25 MSTs plus

~24 SCTs extension

Osservatori gamma operativi al suolo

MAGIC Canary Islands 2200 m asl
2 x 17m telescopes. Magic I in operation since
Oct 2003, Magic II first light shown at ICRC09

VERITAS Arizona, USA 1800 m asl
4 telescopes of 12m diameter
fully operational from fall 2007

MAGIC

HESS Namibia 1800 m asl
HESS I: 4 telescopes of 12m diameter
HESS II: 28 m diameter

VERITAS

HESS

MAGIC

VERITAS

HESS

Dove?

Rendering della schiera di telescopi nel sito sud

.. tanti diversi
apparati , ma
stesso scopo

Creazione e
accelerazione

Propagazione

Modulazione

I raggi cosmici
viaggiano per
circa 10 milioni
di anni nella
nostra galassia
prima di arrivare
a noi

Raggi cosmici

γ

ν

Esperimenti spaziali a circa 400 km di altezza

Rivelazione diretta

Atmosfera
40 km

Balloons ~ 40 km
~3 g/cm² residual atmosphere

Rivelatori di sciami
estesi

Esperimenti di
Fisica delle
Astroparticelle

Rivelatori in alta montagna

Rivelatori Cherenkov

Acceleratori di
particelle

Esperimenti sottoterra, sotto il ghiaccio,
sotto l'acqua

Durante il 20 esimo secolo la ricerca ci ha mostrato la vastità dell'Universo e ci ha rivelato violenti fenomeni cosmici e misteri

e il futuro?

I raggi gamma arrivano direttamente dalla sorgente, non sono deviati dai campi magnetici in quanto neutri

Onde Radio, raggi di sole, fotoni Gamma Lo spettro elettromagnetico

Astronomia multimessaggero: neutrini

- I buchi neri delle galassie attive sono le sorgenti dei neutrini e quindi dei raggi cosmici di altissima energia (UHECR) ?
- Il caso di EHE 170922 (TXS 0506 +056)

Multiwavelength observations of TXS 0506+056 before and after IceCube-170922A

Science 361, eaat1378 (2018) 12July

Gli esperimenti di raggi gamma di alta energia

Energy

SAS-2
11/1972-7/1973

Anti-Coincidence Dome

Spark Chamber

Trigger Telescope

Cerenkov Counter

Energy Calorimeter

Veto counter

Spark chamber

Cerenkov counter

Scintillation counter 1

Scintillation counter 2

Plastic scintillation counter

Cos-B
8/1975-4/1982

Le missioni per lo studio dei raggi gamma

EGRET
4/1991-1999

ANTI-COINCIDENCE SCINTILLATION DOME

CLOSELY SPACED SPARK CHAMBERS

WIDELY SPACED SPARK CHAMBERS

TIME OF FLIGHT COINCIDENCE SYSTEM

PRESSURE VESSEL

NaI (TL) ENERGY MEASUREMENT COUNTER

ELECTRONICS

GAS REPLENISHMENT SYSTEM