PERUGIA

7^o 8 LUGLIO
2025

**Oltre i confini della terra:
la Fisica nello spazio**

Oscar Adriani

INFN

OLTRE

le frontiere

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Piano Triennale

2026 | 2028

THE EARTH'S ATMOSPHERE

- Atmosfera: strato di gas che avvolge la terra
- Fondamentale per la vita!
 - Blocca la radiazione UV
 - Limita le escursioni termiche tra il giorno e la notte
 - Non si disperde nello spazio a causa della forza di gravità
 - Primi 32 km: 99% dei gas

Ma per la fisica (e anche per l'astronomia e l'astrofisica)

- L'atmosfera funge da filtro per:
 - la gran parte dei Raggi Cosmici
 - i Raggi X e γ emessi dalle sorgenti astrofisiche
 - la radiazione cosmica di fondo
- E distorce in modo importante le immagini dei telescopi ottici
- E' necessario andare 'Oltre i confini della terra' per fare con precisione questo tipo di misure

- Questa non sarà una review scientifica completa di tutte le attività INFN nello spazio
- Focus storico per far vedere come l'INFN ha 'cambiato il modo di approcciarsi' alla fisica nello spazio

Cominciamo dai Raggi Cosmici carichi

- I raggi cosmici sono un flusso di particelle cariche ad alta energia che colpisce la terra
- Origine:
 - Il Sole
 - Le stelle della nostra galassia (Galattici)
 - Sorgenti al di fuori della Via Lattea (Extragalattici)
- La Terra è bombardata costantemente da un flusso di particelle con uno spettro estremamente ampio di energia
 - da 10^6 eV a 10^{20} eV
- La maggior parte dei RC di bassa energia non supera il campo magnetico terrestre e/o l'atmosfera

Raggi Cosmici
Primari

Raggi Cosmici
Secondari

Composizione dei Raggi Cosmici

- Protoni (nuclei di idrogeno) ~ 87%
- Nuclei di He ~12%
- 1% nuclei pesanti (principalmente carbonio)
- < 1% elettroni
- Anti-protoni e positroni

Cosa è necessario misurare?

- L'energia del RC
 - Il segno della carica del RC
 - La carica Z del RC
 - La tipologia di RC (adrone vs leptone)
 - La direzione di arrivo (non molto importante.....)
-
- Tutte cose che l'INFN ha sempre saputo fare benissimo fin dall'inizio delle sue attività, nel campo della fisica delle particelle e della fisica nucleare!
-
- In questa maniera si identifica completamente il RC

E qui comincia l'avventura INFN!

PAMELA: la prima avventura scientifica nello spazio per l'INFN

La domanda degli anni 80:
Esistono anti-galassie,
con anti-stelle, che
emettono anti-Raggi
Cosmici?
Antiprotoni e antielettroni

Cominciando dai palloni stratosferici (MASS e Caprice)

Lo strumento PAMELA

- Strumenti ridondanti:
- Spettrometro, fatto da un magnete permanente e un sistema di tracciamento al silicio ($4\ \mu\text{m}$ risoluzione)
- TOF (trigger, beta and carica)
- Calorimetro EM (W-Si, $16.3\ \text{l.r.}$, $0.7\ \text{l.i.}$; reiezione adrone/leptone $> 10^4$)
- Rivelatore di neutroni (a contatori di ^3He) $\rightarrow$ aiuta la discriminazione di sciame electromagnetici da adronici.

G.F.: $21.5\ \text{cm}^2\ \text{sr}$
Massa: $470\ \text{kg}$
Dim. : $130 \times 70 \times 70\ \text{cm}^3$
Potenza: $360\ \text{W}$

Un nuovo modo di produrre un esperimento per lo spazio: lo 'spirito INFN'

Il lancio da Bajkonur (15/06/2006)

I risultati scientifici di Pamela

nature

LETTERS

Vol 458 | 2 April 2009 | doi:10.1038/nature07942

An anomalous positron abundance in cosmic rays with energies 1.5–100 GeV

O. Adriani^{1,2}, G. C. Barbarino^{3,4}, G. A. Bazilevska⁵, R. Bellotti^{6,7}, M. Boezio⁸, E. A. Bogomolov⁹, L. Bonechi^{1,2}, M. Bongi², V. Bonvicini⁸, S. Bottai², A. Bruno^{6,7}, F. Cafagna⁷, D. Campana⁴, P. Carlson¹⁰, M. Casolino¹¹, G. Castellini^{11,13}, M. P. De Pascale^{11,13}, G. De Rosa⁴, N. De Simone^{11,13}, V. Di Felice^{11,13}, A. M. Galper¹⁴, L. Grishantseva¹⁴, P. Hofverberg¹⁰, S. V. Koldashov¹⁴, S. Y. Krutkov⁹, A. N. Kvashnin⁵, A. Leonov¹⁴, V. Malvezzi¹¹, L. Marcelli¹¹, W. Menn¹⁵, V. V. Mikhailov¹⁴, E. Mocchiutti⁸, S. Orsi^{10,11}, G. Osteria⁴, P. Papini², M. Pearce¹⁶, P. Picozza^{11,13}, M. Ricci¹⁷, S. B. Ricciarini², M. Simon¹⁵, R. Sparvoli^{11,13}, P. Spillantini^{1,2}, Y. I. Stozhkov⁵, A. Vacchi⁸, E. Vannucci⁹, G. Vasilyev⁹, S. A. Voronov¹⁴, Y. T. Yurkin¹⁴, G. Zampa⁸, N. Zampa⁸ & V. G. Zverev¹⁴

Nature 458, 2009
1333 citations so far !

E poi?

- PAMELA è stato solo il primo di una lunga serie di esperimenti di grande successo!
 - FERMI (dal 2008)
 - AMS-02 (dal 2011)
 - DAMPE (dal 2015)
 - CALET (dal 2015)
 - CSES-01 – CSES-02 (2018 e 2025)
 - IXPE (dal 2021)
 -

Cosa possiamo imparare dai RC carichi

- RC di bassa energia
- Fisica solare
 - Space weather
 - Geofisica

- Electroni+positroni:
- Propagazione
 - Accelerazione
 - Nuove sorgenti

- CR acceleration
- CR propagation
- New sources

E cosa possiamo imparare dai Raggi γ

Exploring the Extreme Universe

Supernova Remnants

Gamma-ray Bursts

Pulsar Wind Nebulae

Active Galactic Nuclei

Extragalactic Background

About Fermi

Click on the images or topic name for information about these science topics.

Catalogs

Binary Sources

Dark Matter

Pulsars

Terrestrial Gamma-ray Flashes

Diffuse Gamma Radiation

Ed ora alcuni highlight

RC primari: flussi di Protoni ed Elio

I. De Mitri NOW 2024

Lo scenario ‘tradizionale’ (‘tutto va come una legge di potenza’) è stato «distrutto» dalle misure degli ultimi 15 anni!!!

RC secondari: da dove viene il break nello spettro? Iniezione o diffusione?

Ci si aspetta che i RC secondari abbiano spettri diversi nelle due ipotesi 'break nella iniezione / break nella diffusione

Elettroni+positroni

Positroni

Le antiparticelle nei RC

Pulsar or Dark Matter?

secondaries from CR interactions

primary positrons

RC di bassa energia

<https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.121.051102>

<https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRevLett.121.051101>

Take-home message
 → experiments operated in the last ~ 15 years (mainly AMS and PAMELA) provided a lot of data of extreme interest for the HeliPhysics and SpaceWeather communities

<https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaa9b2>

- Modulazione solare
 - Cicli solari
- Fenomeni solari transitori
 - Space weather, pericoloso per i satelliti!
- Studio del campo geomagnetico
 - Fasce di Van Allen
 - Particelle intrappolate

Il catalogo delle sorgenti γ di FERMI

Fermi Large Area Telescope Fourth Source Catalog Data Release 4 (4FGL-DR4)

J. BALLE¹, P. BRUEL², T. H. BURNETT³ AND B. LOTT⁴
THE *Fermi*-LAT COLLABORATION

¹Université Paris Saclay and Université Paris Cité, CEA, CNRS, AIM, F-91191 Gif-sur-Yvette, France

²Laboratoire Leprince-Ringuet, École polytechnique, CNRS/IN2P3, F-91128 Palaiseau, France

³Department of Physics, University of Washington, Seattle, WA 98195-1560, USA

⁴Université Bordeaux, CNRS, LP2I Bordeaux, UMR 5797, F-33170 Gradignan, France

ABSTRACT

We present an incremental version (4FGL-DR4, for Data Release 4) of the fourth *Fermi*-LAT catalog containing 7194 γ -ray sources. Based on the first 14 years of science

data in the energy range from 50 MeV to 1 TeV, it uses the same analysis methods as the 4FGL-DR3 catalog did for 12 years of data, with only a few improvements. The

■ No association	■ Possible association with SNR or PWN	■ AGN
★ Pulsar	▲ Globular cluster	◆ Starburst Galaxy
⊠ Binary	+ Galaxy	○ SNR
★ Star-forming region	□ Unclassified source	◆ PWN
		◆ Nova

La fisica solare e lo 'space weather' anche con i γ

CSES-01 e CSES-02

OBIETTIVI DI CSES (CHINA SEISMO-ELECTROMAGNETIC SATELLITE)

Monitor di attività sismica

studio dell'accoppiamento litosfera-atmosfera-ionosfera

Monitor di SpaceWeather

studio dell'ambiente di radiazione nella magnetosfera

Il lancio di CSES-02 a Giugno 25, fresco fresco!

Boot Number: 344
Run Number: 3089
Event Index: 77
Trigger Mask: 0x00958720
Time: 2025-06-24 13:52:07.747859955

Deposited Energy:
64.25 MeV

Lat: 41.74 >>> 49.28
Lon: 159.19 >>> 156.69

E poi?

Futuri esperimenti per RC

- GAPS, su pallone stratosferico dall'Antartide (2025)
- HERD, sulla Stazione Spaziale Cinese
- Intensa attività di R&D per vedere gli sciami atmosferici di altissima energia dallo spazio
 - SPB1-2 (nel 2023 su pallone)
 - POEMMA
- NUSES su minisatellite italiano
- Un grande esperimento 'Post FERMI' per i raggi γ , anche di bassa energia
- Un grande spettrometro magnetico 'Post AMS'
 - AMS100?
 - Aladino?

GAPS

- Misura di antiprotoni e antideuterio da pallone stratosferico

Tentativo di lancio – 1 gennaio 2025

Il pallone in attesa di essere rilasciato.

7 Luglio 20

Altri tipi di Fisica per i quali lo spazio è essenziale

- Misure cosmologiche
 - Misura della radiazione cosmica di fondo (CMB)
 - Materia oscura ed energia oscura
- Astronomia multimessaggera
- Onde gravitazionali

Non coperte per
mancanza di tempo

LISA: Osservazione di Onde Gravitazionali dallo spazio

Lancio previsto nel 2034

- Long baseline: 2.5 Mkm
- Sensitivity bucket $\sim$ mHz
- Mission duration: 4 to 10 years
- Dominating laser phase noise: synthetic interferometry (TDI)
- LISA Red Book: arXiv:2402.07571

- Con LISA è possibile esplorare le basse frequenze
- Complementare a ET

- Several classes of compact binaries expected
 - Supermassive black hole binaries (SMBH)
 - Stellar mass black hole binaries (sBH)
 - Double white dwarfs
 - Extreme mass ratio inspirals

Challenge principale:
Osservazione contemporanea di diverse GW, dato che la sensibilità a basse frequenze permette una 'early observation' del segnale

La Commissione Scientifica 2 dell'INFN

CSN2

COSINUS_CSN2
BULLKID_DM
CRESST
CYGNO
DARKSIDE
EUCLID
FLASH
QUAX
SABRE
XENON

**Universo
oscuro**

Esperimento
spaziale

**Gravità e Fisica
quantistica**

ARCHIMEDES_2
ET_ITALIA
GINGER
GRAFIQO
LISA
MEGANTE2
MOONLIGHT-2
VIRGO

AMS2
AUGER
CTA
FERMI
GAPS
HERD_DMP
KM3
LIMADOU_CSN2
LITEBIRD
LSPE
QUBIC
RESNOVA_CSN2
SPB2
SWGGO
XRO

**Radiazione
Cosmica**

**Fisica dei
Neutrini**

CUORE_CUPID
GERDA
HOLMES+
JUNO
NUCLEUS
KATRIN_TRISTAN

Conclusioni

- Gli esperimenti spaziali sono stati 'rivoluzionati' dal 'metodo INFN'
- Negli ultimi 20 anni sono stati fatti progressi incredibili e del tutto inaspettati andando a fare misure 'Oltre le frontiere'
- La Fisica nello spazio si e' rivelata incredibilmente interessante, inaspettata, vitale

- Cosa ci riserva il futuro?

DA QUALCHE PARTE
QUALCOSA DI
INCREDIBILE È
IN ATTESA DI
ESSERE SCOPERTO.

CARL SAGAN

Backups

Cosa possiamo imparare dai RC carichi

- **Origin:** Shock acceleration in SNRs for primary CRS (p , C-N-O, Fe)
- **Propagation:** Diffusive propagation in interstellar & interplanetary turbulence.
- Collisions with ISM gas and production of secondaries: Li-Be-B, antimatter, γ -rays, etc.
- **Exotic contribution:** dark matter, primordial antimatter.

Primary GCRs (e^- , p , He, C, O, Ne, Mg, Si, ..., Fe) are thought to be accelerated by astrophysical processes (as supernovae shocks) in our Galaxy.

Secondary GCRs (e^+ , $\bar{p}$, Li, Be, B, F, sub-Fe, ...) are produced from collision of primaries with the interstellar medium.

Galactic Disk

Heliosphere

Cosmic rays close to Earth

- Solar activity (e.g. modulation)
- Earth magnetic field

Adapted from A. Oliva

CMB OBSERVATIONS

Planck 2018

Temperature anisotropies
Measured by Planck down to the cosmic variance limit

Polarization anisotropies
(two modes: E and B)
Complete characterization is the main target of next-gen experiments
Primordial B-modes are a smoking gun for inflation

Lensing anisotropies
CMB window to structure formation and the late Universe
Also a target for next-gen experiments
Relevant for e.g. neutrino masses

THE EUCLID MISSION

Euclid is an ESA M-class space mission devoted to studying :

- the origin of the **accelerated expansion** of the Universe
- **Dark energy, dark matter** and the behaviour of **gravity at large scales**
- + **neutrino masses, the initial conditions of cosmological evolution, ...**

Euclid will measure **weak lensing** and **galaxy clustering** observing 15.000 deg² (>1/3 of the sky) down to z=2 (lookback time 10 Gyrs) + 3 deep fields (40 deg²)

This will allow to reconstruct the **expansion history** and the **growth of cosmological structure**

Euclid lift-off on July 1st, 2023!