XYZ: stati a quattro quark?

Alessandro Pilloni

"Sapienza" Università di Roma e INFN

Tor Vergata, Roma – 9 Aprile 2015

Sommario

- «Paesaggi esotici»
- Il tetraquark compatto
- Produzione di esotici a LHC
- Risonanze di Feshbach
- Conclusioni

Quarkonio: l'ortodossia

Il **quarkonio pesante** è un settore estremamente utile per la comprensione di QCD

$$\alpha_s(M_Q) \sim 0.3$$

(regime perturbativo)

OZI-rule, QCD multipole

Modelli a potenziale

(definiti nel limite $M_Q \rightarrow \infty$)

$$V(r) = -\frac{C_F \alpha_s}{r} + \sigma r$$

(potenziale di Cornell)

Soluzione eq. Schrödinger → **spettro**

Teorie effettive

(HQET, NRQCD...)

Integrare via i gradi di libertà pesanti

(spettri), produzione e decadimento

Quarkonio: l'ortodossia?

Negli ultimi anni sono state scoperte una serie di **risonanze inattese**

che decadono soprattutto in charmonio + adroni leggeri

Difficili da **riconciare** con una interpretazione in termini di charmonio standard

X(3872)

- **Molto vicina** alla soglia DD^*
- **Troppo stretta** per essere un charmonio a soglia
- **Violazione dell'isospin**

$$\frac{\Gamma(X \rightarrow J/\psi \omega)}{\Gamma(X \rightarrow J/\psi \rho)} \sim 0.8 \pm 0.3$$
- **Massa** non compatibile con le predizioni per $\chi_{c1}(2P)$

$$M = 3871.68 \pm 0.17 \text{ MeV}$$

$$M_X - M_{DD^*} = -0.14 \pm 0.22 \text{ MeV}$$

$$\Gamma < 1.2 \text{ MeV @90\%}$$

$$J^{PC} = 1^{++}$$

Stati vettoriali: le Y

Molte risonanze inattese con $J^{PC} = 1^{--}$ sono state trovate nelle analisi ISR

Viste in pochi stati finali, soprattutto $J/\psi \pi\pi$ e $\psi(2S) \pi\pi$

Non visti decadere in mesoni open-charm, da confrontare con

$$\frac{B(\psi(3770) \rightarrow D\bar{D})}{B(\psi(3770) \rightarrow J/\psi\pi\pi)} > 480$$

Stati carichi: le Z

Sono stati osservati anche risonanze cariche di tipo charmonio, **necessari 4q**

Due stati $J^{PC} = 1^{+-}$ sono poco sopra la soglia $D^{(*)}D^*$

$$Z_c(3900)^+ \rightarrow J/\psi \pi^+ e \rightarrow (DD^*)^+$$

$$M = 3888.7 \pm 3.4 \text{ MeV}, \Gamma = 35 \pm 7 \text{ MeV}$$

$$Z'_c(4020)^+ \rightarrow h_c \pi^+ e \rightarrow \bar{D}^{*0} D^{*+}$$

$$M = 4023.9 \pm 2.4 \text{ MeV}, \Gamma = 10 \pm 6 \text{ MeV}$$

Lo stesso accade alle soglie $B^{(*)}B^*$
con le $Z_b(10610)$ e $Z'_b(10650)$

$$Z(4430)^+ \rightarrow \psi(2S) \pi^+$$

$$I^G J^{PC} = 1^+ 1^{+-}$$

$$M = 4475 \pm 7_{-25}^{+15} \text{ MeV}$$

$$\Gamma = 172 \pm 13_{-34}^{+37} \text{ MeV}$$

Lontana dalle soglie
open-charm

State	M (MeV)	Γ (MeV)	J^{PC}	Process (mode)	Experiment ($\#\sigma$)
$X(3823)$	3823.1 ± 1.9	< 24	$?^{? -}$	$B \rightarrow K(\chi_{c1}\gamma)$	Belle ^[23] (4.0)
$X(3872)$	3871.68 ± 0.17	< 1.2	1^{++}	$B \rightarrow K(\pi^+\pi^-J/\psi)$	Belle ^[24,25] (>10), BABAR ^[26] (8.6)
				$p\bar{p} \rightarrow (\pi^+\pi^-J/\psi) \dots$	CDF ^[27,28] (11.6), D0 ^[29] (5.2)
				$pp \rightarrow (\pi^+\pi^-J/\psi) \dots$	LHCb ^[30,31] (np)
				$B \rightarrow K(\pi^+\pi^-\pi^0J/\psi)$	Belle ^[32] (4.3), BABAR ^[33] (4.0)
				$B \rightarrow K(\gamma J/\psi)$	Belle ^[34] (5.5), BABAR ^[35] (3.5)
					LHCb ^[36] (>10)
				$B \rightarrow K(\gamma\psi(2S))$	BABAR ^[35] (3.6), Belle ^[34] (0.2)
					LHCb ^[36] (4.4)
				$B \rightarrow K(D\bar{D}^*)$	Belle ^[37] (6.4), BABAR ^[38] (4.9)
$Z_c(3900)^+$	3888.7 ± 3.4	35 ± 7	1^{+-}	$Y(4260) \rightarrow \pi^-(D\bar{D}^*)^+$	BES III ^[39] (np)
				$Y(4260) \rightarrow \pi^-(\pi^+J/\psi)$	BES III ^[40] (8), Belle ^[41] (5.2)
					CLEO data ^[42] (>5)
$Z_c(4020)^+$	4023.9 ± 2.4	10 ± 6	1^{+-}	$Y(4260) \rightarrow \pi^-(\pi^+h_c)$	BES III ^[43] (8.9)
				$Y(4260) \rightarrow \pi^-(D^*\bar{D}^*)^+$	BES III ^[44] (10)
$Y(3915)$	3918.4 ± 1.9	20 ± 5	0^{++}	$B \rightarrow K(\omega J/\psi)$	Belle ^[45] (8), BABAR ^[33,46] (19)
				$e^+e^- \rightarrow e^+e^-(\omega J/\psi)$	Belle ^[47] (7.7), BABAR ^[48] (7.6)
$Z(3930)$	3927.2 ± 2.6	24 ± 6	2^{++}	$e^+e^- \rightarrow e^+e^-(D\bar{D})$	Belle ^[49] (5.3), BABAR ^[50] (5.8)
$X(3940)$	3942_{-8}^{+9}	37_{-17}^{+27}	$?^{?+}$	$e^+e^- \rightarrow J/\psi(D\bar{D}^*)$	Belle ^[51,52] (6)
$Y(4008)$	3891 ± 42	255 ± 42	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\pi^+\pi^-J/\psi)$	Belle ^[41,53] (7.4)
$Z(4050)^+$	4051_{-43}^{+24}	82_{-55}^{+51}	$?^{?+}$	$\bar{B}^0 \rightarrow K^-(\pi^+\chi_{c1})$	Belle ^[54] (5.0), BABAR ^[55] (1.1)
$Y(4140)$	4145.6 ± 3.6	14.3 ± 5.9	$?^{?+}$	$B^+ \rightarrow K^+(\phi J/\psi)$	CDF ^[56,57] (5.0), Belle ^[58] (1.9), LHCb ^[59] (1.4), CMS ^[60] (>5) D0 ^[61] (3.1)
$X(4160)$	4156_{-25}^{+29}	139_{-65}^{+113}	$?^{?+}$	$e^+e^- \rightarrow J/\psi(D^*\bar{D}^*)$	Belle ^[52] (5.5)
$Z(4200)^+$	4196_{-30}^{+35}	370_{-110}^{+99}	1^{+-}	$\bar{B}^0 \rightarrow K^-(\pi^+J/\psi)$	Belle ^[62] (7.2)

State	M (MeV)	Γ (MeV)	J^{PC}	Process (mode)	Experiment ($\#\sigma$)
$Y(4220)$	4196_{-30}^{+35}	39 ± 32	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\pi^+\pi^-h_c)$	BES III data ^[63,64] (4.5)
$Y(4230)$	4230 ± 8	38 ± 12	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\chi_{c0}\omega)$	BES III ^[65] (>9)
$Z(4250)^+$	4248_{-45}^{+185}	177_{-72}^{+321}	$?^{?+}$	$\bar{B}^0 \rightarrow K^-(\pi^+\chi_{c1})$	Belle ^[54] (5.0), BABAR ^[55] (2.0)
$Y(4260)$	4250 ± 9	108 ± 12	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\pi\pi J/\psi)$	BABAR ^[66,67] (8), CLEC ^[68,69] (11) Belle ^[41,53] (15), BES III ^[40] (np)
				$e^+e^- \rightarrow (f_0(980)J/\psi)$	BABAR ^[67] (np), Belle ^[41] (np)
				$e^+e^- \rightarrow (\pi^-Z_c(3900)^+)$	BES III ^[40] (8), Belle ^[41] (5.2)
				$e^+e^- \rightarrow (\gamma X(3872))$	BES II ^[70] (5.3)
$Y(4290)$	4293 ± 9	222 ± 67	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\pi^+\pi^-h_c)$	BES III data ^[63,64] (np)
$X(4350)$	$4350.6_{-5.1}^{+4.6}$	13_{-10}^{+18}	$0/2^{?+}$	$e^+e^- \rightarrow e^+e^-(\phi J/\psi)$	Belle ^[58] (3.2)
$Y(4360)$	4354 ± 11	78 ± 16	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\pi^+\pi^- \psi(2S))$	Belle ^[71] (8), BABAR ^[72] (np)
$Z(4430)^+$	4478 ± 17	180 ± 31	1^{+-}	$\bar{B}^0 \rightarrow K^-(\pi^+\psi(2S))$	Belle ^[73,74] (6.4), BABAR ^[75] (2.4) LHCb ^[76] (13.9)
				$\bar{B}^0 \rightarrow K^-(\pi^+J/\psi)$	Belle ^[62] (4.0)
$Y(4630)$	4634_{-11}^{+9}	92_{-32}^{+41}	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\Lambda_c^+\bar{\Lambda}_c^-)$	Belle ^[77] (8.2)
$Y(4660)$	4665 ± 10	53 ± 14	1^{--}	$e^+e^- \rightarrow (\pi^+\pi^- \psi(2S))$	Belle ^[71] (5.8), BABAR ^[72] (5)
$Z_b(10610)^+$	10607.2 ± 2.0	18.4 ± 2.4	1^{+-}	$\Upsilon(5S) \rightarrow \pi(\pi\Upsilon(nS))$	Belle ^[78,79] (>10)
				$\Upsilon(5S) \rightarrow \pi^-(\pi^+h_b(nP))$	Belle ^[78] (16)
				$\Upsilon(5S) \rightarrow \pi^-(B\bar{B}^*)^+$	Belle ^[80] (8)
$Z_b(10650)^+$	10652.2 ± 1.5	11.5 ± 2.2	1^{+-}	$\Upsilon(5S) \rightarrow \pi^-(\pi^+\Upsilon(nS))$	Belle ^[78] (>10)
				$\Upsilon(5S) \rightarrow \pi^-(\pi^+h_b(nP))$	Belle ^[78] (16)
				$\Upsilon(5S) \rightarrow \pi^-(B^*\bar{B}^*)^+$	Belle ^[80] (6.8)

Esotici in QCD su reticolo

Stati risonanti sono stati cercati su reticolo, con il metodo di Lüscher

Prelovsek *et al.*, PRL 111, 192001;
PLB 727, 172-176; PRD 91, 014504

Risultato positivo solo per la
X(3872), ma **lontana dal punto
fisico:**

- $m_\pi = 266$ MeV, $V = 16^3 \times 32$,
 $L = 2$ fm, $p_{min} = 620$ MeV,
 $E_B = -11 \pm 7$ MeV
- Lunghezza di scattering
 $a_0^{DD^*} = -1.7 \pm 0.4$ fm

- Un solo volume, nessun limite continuo ✘
- Diagrammi charm-disconnessi trascurati (OZI soppressi?), ma importanti a $N_c \rightarrow \infty$ ✘
- Nessuna violazione di isospin, come distinguerla da un $\chi_{c1}(2P)$ standard? ✘

Studi preliminari sul canale $C = 2$ in Esposito, Papinutto, AP, Polosa, Tantalo, PRD88, 054029;
Guerrieri, Papinutto, AP, Polosa, Tantalo, PoS LATTICE2014, 106;

Fenomenologia: i modelli proposti

Molecole di adroni (debolmente legate)

$$3_c \times \bar{3}_c \in 1_c$$

Diquark-antidiquark
(tetraquark)

Glueball, Hybrids
(con gluoni di valenza),
Born-Oppenheimer 4q

$$8_c \times 8_c \in 1_c$$

Hadrocharmonio
(forze di Van der Waals)

Cuspidi (effetti cinematici)

Tetraquark

In un modello a quark costituenti, si può definire uno **stato compatto diquark-antidiquark**

$$[cq]_{S=0}[\bar{c}\bar{q}]_{S=1} + h.c.$$

Maiani, Piccinini, Polosa, Riquer PRD71 014028

Faccini, Maiani, Piccinini, AP, Polosa, Riquer PRD87 11, 111102

Spettro calcolabile con l'**hamiltoniana color-spin**:

$$H = \sum_{dq} m_{dq} - 2 \sum_{i<j} \kappa_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \frac{\lambda_i^a}{2} \frac{\lambda_j^a}{2}$$

Schema di decadimento guidato da **HQSS** ✓

Buona comprensione dello spettro osservato ✓

Previsto un intero nonetto per ogni livello ✗

Tetraquark

Un ansatz recente (solo $\kappa_{cq} \neq 0$) dà un accordo ragionevole con i dati

Maiani, Piccinini, Polosa, Riquer PRD89 114010

J^{PC}	$cq \bar{c}\bar{q}$	$c\bar{c} q\bar{q}$	Resonance Assig.	Decays
0^{++}	$ 0, 0\rangle$	$1/2 0, 0\rangle + \sqrt{3}/2 1, 1\rangle_0$	$X_0(\sim 3770 \text{ MeV})$	$\eta_c, J/\psi + \text{light mesons}$
0^{++}	$ 1, 1\rangle_0$	$\sqrt{3}/2 0, 0\rangle - 1/2 1, 1\rangle_0$	$X'_0(\sim 4000 \text{ MeV})$	$\eta_c, J/\psi + \text{light mesons}$
1^{++}	$1/\sqrt{2}(1, 0\rangle + 0, 1\rangle)$	$ 1, 1\rangle_1$	$X_1 = X(3872)$	$J/\psi + \rho/\omega, DD^*$
1^{+-}	$1/\sqrt{2}(1, 0\rangle - 0, 1\rangle)$	$1/\sqrt{2}(1, 0\rangle - 0, 1\rangle)$	$Z = Z(3900)$	$J/\psi + \pi, h_c/\eta_c + \pi/\rho$
1^{+-}	$ 1, 1\rangle_1$	$1/\sqrt{2}(1, 0\rangle + 0, 1\rangle)$	$Z' = Z(4020)$	$J/\psi + \pi, h_c/\eta_c + \pi/\rho$
2^{++}	$ 1, 1\rangle_2$	$ 1, 1\rangle_2$	$X_2(\sim 4000 \text{ MeV})$	$J/\psi + \text{light mesons}$

Le eccitazioni radiali

$$Z(2S) = Z(4430)$$

$$Y_1(2P) = Y(4360)$$

$$Y_2(2P) = Y(4660)$$

decadono preferibilmente in $\psi(2S)$

$L = 1$	$P(S_{c\bar{c}} = 1) : P(S_{c\bar{c}} = 0)$	Assignment	Radiative Decay
Y_1	3:1	$Y(4008)$	$\gamma + X_0$
Y_2	1:0	$Y(4260)$	$\gamma + X$
Y_3	1:3	$Y(4290)/Y(4220)$	$\gamma + X'_0$
Y_4	1:0	$Y(4630)$	$\gamma + X_2$

È stato osservamente recentemente uno stato che sembra rompere HQSS

Faccini, Filaci, Guerrieri, AP, Polosa, arXiv:1412.7196

Molecola

Tornqvist, Z.Phys. C61, 525

Braaten and Kusunoki, PRD69 074005

Swanson, Phys.Rept. 429 243-305

$$X(3872) \sim \bar{D}^0 D^{*0}$$

$$Z_c(3900) \sim \bar{D}^0 D^{*+}$$

$$Z'_c(4020) \sim \bar{D}^{*0} D^{*+}$$

$$Y(4260) \sim \bar{D} D_1$$

Una **coppia di mesoni simile al deuterio**, l'interazione è mediata dallo scambio di mesoni leggeri

- Buona descrizione dei **decadimenti** (nei costituenti) e della **violazione di isospin** in $X(3872)$ ✓
- Gli stati appaiono **vicino alle soglie** ✓ (ma $Z(4430)$ ✗)
- Le energie di legame variano da -70 a -0.1 MeV, o anche **positive** (interazione repulsiva) ✗
- **Spettro non chiaro** (uno stato per ogni soglia?) – **dipende dai dettagli del potenziale** ✗

È interessante cercare modi di decadimento che hanno previsioni diverse nei diversi modelli

es. $Z_c^{(\prime)}$ → $\eta_c \rho$ è previsto essere

- un canale dominante in un modello a 4q compatto
- trascurabile per uno stato molecolare

Esposito, Guerrieri, AP, arXiv:1409.3551

Teorema di Weinberg

- Prevede una relazione model-independent ✓
- Valido in MQ per stati risonanti in onda S se $\sqrt{-2\mu E_B} \ll m_\pi$ ($X(3872)$ ✓, $Y(4260)$ ✗)

Calcolabile dal $BR(X \rightarrow DD^*)$ e Γ_X

$$E_B = -\frac{g_{XDD^*}^4 m_D m_{D^*}}{512\pi^2 (m_D + m_{D^*})^5} (1 - Z)^2$$

Compatibile con zero!!!

$$a_0 = -\frac{2(1 - Z)}{\sqrt{-2\mu E_B} (2 - Z)}$$

Caveat: il formalismo si rompe se $E_B \approx \Gamma_{D^*}$

La scelta di un modello permette di calcolare più osservabili,
 vedi il caso di $\frac{BR(X \rightarrow \psi(2S)\gamma)}{BR(X \rightarrow J/\psi \gamma)}$

Produzione prompt di $X(3872)$

La $X(3872)$ è la regina delle risonanze esotiche Bignamini, Grinstein, Piccinini, Polosa, Sabelli, PRL103, 162001
 L'interpretazione più famosa è in termini di una **molecola $D^0\bar{D}^{0*}$**

Ma l'energia di legame è $E_B \approx -0.14 \pm 0.22$ MeV: **molto piccola!** Esposito, Piccinini, AP, Polosa, JMP 4, 1569
 Un semplice modello a buca quadrata dà $k_{max} \approx 50$ MeV

Quante coppie con impulso relativo così piccolo Guerrieri, Piccinini, AP, Polosa, PRD90, 034003
 vengono prodotte ai collider adronici?

$$\sigma(p\bar{p} \rightarrow X(3872)) \sim \int d^3k |\langle X | D\bar{D}^* \rangle \langle D\bar{D}^* | p\bar{p} \rangle|^2 < \int_{k < k_{max}} d^3k |\langle D\bar{D}^* | p\bar{p} \rangle|^2$$

Con simulazioni MC otteniamo
 $\sigma(p\bar{p} \rightarrow DD^*) \approx 0.1 \text{ nb}$ @ $\sqrt{s} = 1.96$ TeV

Sperimentalmente
 $\sigma(p\bar{p} \rightarrow X(3872)) \approx 30 \text{ nb}!!!$

Problematico per la molecola

Un nuovo meccanismo?

In un'ottica da **palla da biliardo**, i pioni presenti possono **interagire elasticamente** con $D(D^*)$, e **rallentare** le coppie DD^*

Esposito, Piccinini, AP, Polosa, JMP 4, 1569
Guerrieri, Piccinini, AP, Polosa, PRD90, 034003

Il meccanismo implica che i mesoni D sono effettivamente **“spinti” nella buca** (**problema dei 3 corpi classico**)

$X(3872)$ è un **vero stato legato a energia negativa** (stabile)
Si spiega anche la larghezza $\Gamma_X \sim \Gamma_{D^*} \sim 100$ keV

Comparando i tempi di adronizzazione dei mesoni pesanti e leggeri, stimiamo che fino a ~ 3 collisioni possono accadere prima che la coppia pesante voli via

Otteniamo $\sigma(p\bar{p} \rightarrow X(3872)) \sim 5$ nb, **ancora non sufficienti** per spiegare la sezione d'urto sperimentale

$X(3872) \sim$ Deuterio?

Guerrieri, Piccinini, AP, Polosa, PRD90, 034003

Se $X(3872)$ è una molecola $\sim$ deuterio, possiamo comparare le sezioni d'urto

Usiamo i dati sull'antideuterio di ALICE e simuliamo MC per estrapolare ad alto p_T

A $p_{Tmin} \sim 1$ GeV, la sezione d'urto totale esplode, non possiamo normalizzare

Scegliamo un K factor per fittare i dati: indipendente da k_{max}

3 ordini di grandezza più piccolo della sez. d'urto per la $X(3872)$ a CMS!

Sono oggetti simili?

$X(3872) \sim$ Deuterio?

Guerrieri, Piccinini, AP, Polosa, PRD90, 034003

Possiamo procedere al contrario normalizzando ai dati di CMS per la $X(3872)$,
le predizioni per l'antideuterio sono **più grandi** della precedente

Non credete al MC!
Vogliamo i dati!!!

I dati di ALICE sono preliminari
MC non affidabile a $p_T \sim 1$ GeV
Dipendenza dai modelli di adronizzazione
Differenti funzioni di frammentazione

Se ALICE raggiungesse 5 – 8 GeV di p_T , l'argomento sarebbe dirimente

Risonanze di Feshbach

Braaten and Kusunoki, PRD69, 074005

Papinutto, Piccinini, AP, Polosa, Tantalò arXiv:1311.7374

Guerrieri, Piccinini, AP, Polosa, PRD90, 034003

Nella fisica degli atomi freddi esiste un meccanismo per cui due atomi possono interagire tramite **due potenziali**, risp. con lo spettro **continuo (molecola)** and **discreto (4q)**

es. DD^* ha gli stessi numeri quantici di $[cu][\bar{c}\bar{u}]$, gli operatori mischiano sotto rinormalizzazione

Aggiungiamo un'interazione H_{QP}

$$a \simeq a_P + C \sum \frac{|\langle \psi_i | H_{QP} | \psi_{th} \rangle|^2}{E_{th} - E_i}$$

$$\simeq a_{NR} - C \frac{|\langle \psi_{res} | H_{QP} | \psi_{th} \rangle|^2}{\nu}$$

Risonanze di Feshbach

Imponiamo un cutoff su $\nu < 100$ MeV

$X(3872)$ dovrebbe essere uno stato $I = 0$, ma $M(1^{++}) < M(D^{*+}D^-)$

Nessuna componente carica, violazione di isospin!

Se assumiamo $\Gamma = A\sqrt{\nu}$, possiamo usare $Z_c(3900)$ per estrarre $A = 10 \pm 5$ MeV^{1/2}

Questo valore è compatibile per tutte le risonanze (caveat: errori grandi...)

Canale aperto	M_{4q} (MeV)	ν (MeV)	Γ (MeV)	$I^G J^{PC}$	nome
$D^{*0}\bar{D}^0$	3872	0	0	$1^- 1^{++}$	$X(3872)$
$D^{*+}\bar{D}^0$	3900	24	53	$1^+ 1^{+-}$	$Z_c(3900)$
$D^{*+}\bar{D}^0$	4025	8	24	$1^+ 1^{+-}$	$Z'_c(4025)$
$\eta_c(2S)\rho^+$	4475	75	>150	$1^+ 1^{+-}$	$Z(4430)$
$B^{*+}\bar{B}^0$	10610	3	18	$1^+ 1^{+-}$	$Z_b(10610)$
$B^{*+}\bar{B}^{*0}$	10650	1.8	11	$1^+ 1^{+-}$	$Z'_b(10650)$

Nota che $\Gamma(Z'_b)/\Gamma(Z_b) \approx 0.63$, $\sqrt{\nu(Z'_b)/\nu(Z_b)} \approx 0.77$

Conclusioni

Lo studio del **settore esotico pesante** è un **compito difficile**

Gli esperimenti sono molto prolifici! **Feedback costante sulle predizioni**

Gli stati a **multiquark** sono stati scoperti, lo scopo della fenomenologia è offrirne una **descrizione unitaria**

- Il modello **diquark-antidiquark** descrive con successo lo spettro di molti stati e costituisce il miglior candidato per spiegare la **produzione prompt**
- Lo studio degli spettri e dei decadimenti migliora la nostra comprensione, **nuovi dati** attesi da BESIII, LHCb, Belle II, ALICE
- Il meccanismo di Feshbach può essere efficace nel **ridurre il numero di stati** predetti dal modello a tetraquark, e **include alcune proprietà interessanti** della descrizione molecolare

Grazie

BACKUP

Stimare k_{max}

Una soluzione possono essere le FSI (rescattering del DD^*), che permettono un k_{max} dell'ordine di $5m_\pi \sim 700$ MeV

$$\sigma(p\bar{p} \rightarrow DD^* | k < k_{max}) \approx 230 \text{ nb}$$

Artoisenet and Braaten, PRD81, 114018

Comunque, l'applicabilità del teorema di Watson è resa incerta dalla presenza di pioni che interferiscono con la propagazione della coppia DD^*

Bignamini, Grinstein, Piccinini, Polosa, Riquer, Sabelli, PLB684, 228-230

Le FSI saturano il limite di unitarietà? L'influenza dei pioni è piccola?

Artoisenet and Braaten, PRD83, 014019

Guo, Meissner, Wang, Yang, JHEP 1405, 138; EPJC74 9, 3063; CTP 61 354
usano $E_{max} = M_X + \Gamma_X$ per stati instabili sopra soglia

Con scelte differenti, incertezze di 2 ordini di grandezza,
limitazioni sulla predittività

Tetraquark (type I)

In un modello a quark costituenti, si può definire uno **stato compatto diquark-antidiquark**

Maiani, Piccinini, Polosa, Riquer PRD71 014028

$$H = \sum_i m_i - 2 \sum_{i < j} \kappa_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \frac{\lambda_i^a}{2} \frac{\lambda_j^a}{2}$$

La massa costituente del diquark non è nota

Possiamo usare $X(3872)$ come **input per predire le masse** dei mesoni composti dagli stessi diquarks

Predetta $Z_c(3900)$ + uno stato più leggero

Y(4220)

Faccini, Filaci, Guerrieri, AP, Polosa, arXiv:1412.7196

$$\begin{aligned} \langle \chi_{c0}(p) \omega(\eta, q) | Y(\lambda, P) \rangle &= g_\chi \eta \cdot \lambda, \\ \langle Z'_c(\eta, q) \pi(p) | Y(\lambda, P) \rangle &= g_Z \eta \cdot \lambda, \\ \langle h_c(\eta, q) \sigma(p) | Y(\lambda, P) \rangle &= g_h \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \eta^\mu \lambda^\nu \frac{P^\rho q^\sigma}{P \cdot q}, \end{aligned}$$

Rapporto tra i coupling dato da HQSS

$$\frac{\Gamma(Y(4220) \rightarrow \chi_{c0} \omega)}{\Gamma(Y(4220) \rightarrow Z'_c \pi \pi \rightarrow h_c \pi^+ \pi^-)} = 29 \pm 10,$$

$$\frac{\Gamma(Y(4220) \rightarrow \chi_{c0} \omega)}{\Gamma(Y(4220) \rightarrow (h_c \sigma, Z'_c \pi) \rightarrow h_c \pi^+ \pi^-)} = 19 \pm 8 \pm 3,$$

$Z_c(3900) \rightarrow \eta_c \rho$

Se tetraquark

Cinematica da PHS e HQSS

Dinamica stimata con un modello di

Brody, Hwang, Lebed, PRL113, 112001

	Kinematics only		Dynamics included	
	type I	type II	type I	type II
$\frac{\mathcal{BR}(Z_c \rightarrow \eta_c \rho)}{\mathcal{BR}(Z_c \rightarrow J/\psi \pi)}$	5.6×10^2	6.8×10^{-1}	3.9×10^2	4.8×10^{-1}
$\frac{\mathcal{BR}(Z'_c \rightarrow \eta_c \rho)}{\mathcal{BR}(Z'_c \rightarrow h_c \pi)}$	2.0×10^2		3.6×10^1	

Esposito, Guerrieri, AP, arXiv:1409.3551

Se molecola

Non-Relativistic Effective Theory

HQET e Hidden gauge Lagrangian

$$\frac{\mathcal{BR}(Z_c \rightarrow \eta_c \rho)}{\mathcal{BR}(Z_c \rightarrow J/\psi \pi)} = 0.053 \pm 0.011; \quad \frac{\mathcal{BR}(Z'_c \rightarrow \eta_c \rho)}{\mathcal{BR}(Z'_c \rightarrow h_c \pi)} = 0.012 \pm 0.002$$

Stati con doppio charm

Abbiamo proposto di cercare **stati con doppio charm**,
che nel modello a tetraquark sono descritti da $[cc]_{S=1}[\bar{q}\bar{q}]_{S=0,1}$

Questi stati possono essere cercati nei **decadimenti del B_c** @LHC e cercati su reticolo
Esposito, Papinutto, AP, Polosa, Tantalò, PRD88 (2013) 054029

Risultati preliminari sullo spettro per $m_\pi = 490$ MeV, $V = 32^3 \times 64$, $a = 0.075$ fm

Guerrieri, Papinutto, AP, Polosa, Tantalò, PoS LATTICE2014 106

Produzione degli stati T

Tuning del MC

Monte Carlo simulations

A. Esposito

- Compariamo la distribuzione delle coppie $D^0 D^{*-}$ in funzione dell'angolo azimutale relativo con i risultati di CDF

Il run $c\bar{c}$
sottostima la
regione a piccoli
angoli (basso k_0)!

Queste distribuzioni di coppie di mesoni open charm sono disponibili solo per il Tevatron

Nessuna distribuzione è stata (ancora) pubblicata da LHC

Tuning dei pioni

Questo sistema potrebbe modificare le distribuzioni di singoli mesoni open charm utilizzate per il tuning dei MC

Verifichiamo che non succede a meno di un K factor overall

Guerrieri, Piccinini, AP, Polosa, PRD90, 034003

Né a CDF...

...né ad ATLAS

$$Z_c(3900)$$

Notes from the Editors: Highlights of the Year

Published December 30, 2013 | *Physics* 6, 139 (2013) | DOI: 10.1103/Physics.6.139

***Physics* looks back at the standout stories of 2013.**

As 2013 draws to a close, we look back on the research covered in *Physics* that really made waves in and beyond the physics community. In thinking about which stories to highlight, we considered a combination of factors: popularity on the website, a clear element of surprise or discovery, or signs that the work could lead to better technology. On behalf of the *Physics* staff, we wish everyone an excellent New Year.

— Matteo Rini and Jessica Thomas

Four-Quark Matter

Quarks come in twos and threes—or so nearly every experiment has told us. This summer, the BESIII Collaboration in China and the Belle Collaboration in Japan reported they had sorted through the debris of high-energy electron-positron collisions and seen a **mysterious particle** that appeared to contain four quarks. Though other explanations for the nature of the particle, dubbed $Z_c(3900)$, are possible, the “tetraquark” interpretation may be gaining traction: BESIII has since **seen** a series of other particles that appear to contain four quarks.

Images from popular *Physics* stories in 2013.

mysterious particle

Barionio

C. Sabelli

- Una struttura $[cq][\bar{c}\bar{q}]$ è in grado di spiegare la forte dominanza del canale barionico

Rossi, Veneziano,
NPB 123, 507;
Phys.Rept. 63, 149;
PLB70, 255